



Fjölrit Náttúrufræðistofnunar

Válisti fugla 2025





Fjölrit Náttúrufræðistofnunar

Nr. 61, desember 2025

Fjölrit Náttúrufræðistofnunar er ritröð sem hefur verið gefin út frá árinu 1985. Í hverju hefti birtist ein sjálfstæð grein eða skýrsla á sviði náttúrufræða, unnin af starfsmönnum stofnunarinnar eða í samvinnu við þá. Útgáfan er óregluleg. Greinar eru skrifaðar á íslensku með enskum útdrætti, eða á ensku með ítarlegum útdrætti á íslensku.

Vitnið til ritsins á eftirfarandi hátt – Recommended citation:

Náttúrufræðistofnun. (2025). *Válisti fugla 2025*. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 61. Náttúrufræðistofnun. DOI: 10.33112/1027-832X.61

Ritnefnd

María Harðardóttir, Guðmundur Guðmundsson og Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir

Kápumynd

Lundi (*Fratercula arctica*). Ljósmynd eftir Ólaf K. Nielsen

Umbrot

María Harðardóttir

Útgefandi

Náttúrufræðistofnun
Urriðaholtsstræti 6–8
210 Garðabæ
Sími: 430 9000
Netfang: natt@natt.is
www.natt.is

©Náttúrufræðistofnun 2025

ISSN 1027-832X

EFNISYFIRLIT

ÁGRIP.....	5
ABSTRACT.....	5
INNGANGUR.....	7
HÆTTUFLOKKAR OG VIÐMIÐ.....	7
MAT Á FUGLATEGUNDUM.....	10
VÁLISTI FUGLA.....	11
EX – Tegund útdauð í heiminum – Extinct.....	11
RE – Tegundir útdauðar á Íslandi – Regionally Extinct.....	11
CR – Tegundir í bráðri hættu – Critically endangered.....	11
EN – Tegundir í hættu – Endangered.....	12
VU – Tegundir í nokkurri hættu – Vulnerable.....	13
NT – Tegundir í yfirvofandi hættu – Near threatened.....	14
LC – Tegundir metnar en ekki í hættu – Least concern.....	15
LC – Tegundir metnar en ekki í hættu – Least concern.....	16
NA – Tegundir á heimsválista sem eru flækingar á Íslandi – Not applicable.....	17
NA – Tegundir á heimsválista sem eru flækingar á Íslandi – Not applicable.....	18
HEIMILDIR.....	19
FJÖLRIT NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUNAR.....	20



ÁGRIP

Válisti fugla 2025 er gefinn út af Náttúrufræðistofnun og inniheldur mat á stöðu fuglategunda (Aves) á Íslandi. Megintilgangurinn er að draga fram hvaða tegundir eru í útrýmingarhættu hér á landi og veita upplýsingar sem styðja við aðgerðir til verndar náttúrunni.

Válistinn er unninn samkvæmt viðmiðum Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) þar sem tegundir eru flokkaðar í hættuflokka á grundvelli gagna um útbreiðslu, stofnstærð og breytingar á stofnum. Með því að greina og fylgjast með ástandi fuglategunda hjálpa válistar stjórnvöldum, verndarsamtökum og vísindamönnum að forgangsraða verndunaraðgerðum og stuðla að viðhaldi líffræðilegs fjölbreytileika. Válistar eru því lykilatriði í stefnumótun náttúruverndar, sem og við mat á áhrifum umhverfisbreytinga, hvort sem þær eru af náttúrulegum eða mannlegum orsökum.

Niðurstöðurnar sýna að af 91 metinni fuglategund eru 43 á válista (EX, RE, CR, EN, VU). Ein tegund er útdauð á heimsvísu (EX) og þrjár eru ekki lengur varpfuglar á Íslandi (RE). Af þeim tegundum sem teljast í hættu eru fjórar í bráðri hættu (CR), tíu í hættu (EN) og 25 í nokkurri hættu (VU). Að auki eru 19 tegundir taldar í yfirvofandi hættu (NT).

ABSTRACT

Icelandic Red List of Birds 2025 is published by Natural Science Institute of Iceland and presents an assessment of the conservation status of bird species (Aves) in Iceland. The main objective is to identify species that are threatened with extinction and to provide information that supports actions for nature conservation.

The assessment follows the criteria of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), where species are classified into threat categories based on data on distribution, population size and trends. By analysing and monitoring the status of bird populations, Red Lists help authorities, conservation organisations and scientists to prioritise conservation measures and contribute to the maintenance of biological diversity. Red Lists are therefore an important tool in nature conservation policy and in the evaluation of environmental change, whether of natural or human origin.

Results show that of the 91 assessed bird species, 43 are red-listed (EX, RE, CR, EN, VU). One species is globally extinct (EX) and three are regionally extinct (RE). Of the species classified as threatened, four are critically endangered (CR), ten endangered (EN), and 25 vulnerable (VU). In addition, nineteen species are considered near threatened (NT).



INNGANGUR

Válistar eru skrár yfir tegundir lífvera sem eiga undir högg að sækja eða eru taldar vera í útrýmingarhættu í tilteknu landi eða svæði. Þeir byggja jafnan á breytingum á stofnstærð og ná yfir tímabil sem nemur þremur kynslóðum. Breytingarnar geta verið í gangi nú, væntanlegar í nágrenni framtíð eða hafa átt sér stað síðustu 10–20 ár eða allt að 100 ár fyrir langlífar lífverur. Válistar ná ekki yfir minni eða hægari breytingar nema þær hafi leitt til þess að stofnar hafa minnkað verulega eða orðið mjög sundraðir.

Válistar nýtast við að forgangsraða náttúruverndarverkefnum og efla þekkingu til að ná markmiðum um vernd líffræðilegs fjölbreytileika. Þeir eru unnir samkvæmt viðmiðum Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) sem gera kröfu um nokkuð nákvæma vitneskju um útbreiðslu tegunda, fjölda einstaklinga og stofnstærðarbreytingar. Í íslenskum válistum er aðeins lagt mat á innlendar tegundir sem finnast hér á landinu eða innan efnahagslögsögunnar.

Í válistanum sem hér birtist er yfirlit yfir fugla (Aves) sem metnir eru í útrýmingarhættu á Íslandi. Fyrsti íslenski fuglaválistinn var gefinn út árið 2000 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000). Á þeim tíma urpu eða höfðu orpið að staðaldri 75 fuglategundir hér á landi og voru 32 þeirra á válistanum. Listinn var endurskoðaður og birtur á vef stofnunarinnar árið 2018 og að nýju árið 2025. Nú hefur verið ákveðið að gefa hann jafnframt út á rafrænu formi þannig að auðvelt sé að prenta hann út og vitna í hann.

Válistar innihalda allar tegundir, undirtegundir og afbrigði sem hafa verið metin í einhverja eftirtalinna flokka: EX (útdauð á heimsvísu), RE (útdauð á svæði), CR (í bráðri hættu), EN (í hættu), VU (í nokkurri hættu), NT (í yfirvofandi hættu) og DD (vantar gögn). Þær tegundir eru tilnefndar sem válistategundir. Tegundir í flokkunum CR, EN og VU eru taldar vera í útrýmingarhættu.

Listinn var unninn á grundvelli staðla og leiðbeininga IUCN frá árinu 2017 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee, 2017) sem eru alþjóðlega viðurkenndir og notaðir við gerð

válista um allan heim. Matskerfinu má beita á undirtegundir, tegundir, ættkvíslir og ættir lífvera, hvort sem er á heimsvísu eða fyrir tiltekin lönd eða svæði eins og hér er gert.

Hættuflokkarnir sem notaðir eru við válistamat segja til um hve mikil hættu er á að tegundin deyi út ef ríkjandi aðstæður haldast óbreyttar. Á válista eru bæði tegundir sem tilheyra stórum og fálíðuðum stofnum. Margar tegundir lenda á válista vegna minnkandi stofna, oft af mannavöldum eða breytingum á gæðum búsvæða, auk þess sem loftslagsbreytingar geta haft áhrif. Oftast er það samspil nokkurra þátta sem leiðir til þess að tegund fer á válista.

Umsjón með válistamati fugla á válista hafði Aldís Erna Pálsdóttir vistfræðingur og byggir listinn á gögnum um útbreiðslu og stofnstærðir tegunda sem varðveitt eru hjá Náttúrufræðistofnun.

HÆTTUFLOKKAR OG VIÐMIÐ

Við gerð válista er tegundum skipað í skilgreinda hættuflokka sem sýna hve mikilli útrýmingarhættu þær eru í ef ríkjandi aðstæður haldast óbreyttar (1. tafla). Válistategundir eru þær sem falla í flokkana útdauð á svæði (RE), í bráðri hættu (CR), í hættu (EN), í nokkurri hættu (VU), í yfirvofandi hættu (NT) og gögn vantar (DD). Tegundir í flokkunum CR, EN og VU eru taldar vera í útrýmingarhættu (1. mynd).

Við válistamat eru allar tegundir metnar með hliðsjón af fimm viðmiðum sem IUCN hefur þróað (IUCN Standards and Petitions Subcommittee, 2017) (2. tafla). Ef tegund uppfyllir að minnsta kosti eitt af skilyrðum viðmiðanna fellur hún í einn af þremur hættuflokkum: í bráðri hættu (CR), í hættu (EN) og í nokkurri hættu (VU). Markmið flokkunar er hættumat, þar sem reynt er að segja fyrir um líkur á því að tegund deyi út.

Við mat á tegundum er tekið mið af núverandi ástandi stofna og þróun þeirra í seinni tíð eða framtíð. Það þýðir að tegundir sem áður höfðu farið í gegnum fækkun uppfylla ekki endilega skilyrði fyrir því að vera á válista ef stofnar þeirra eru nú stöðugir eða hafa styrkst.



Í stuttu máli miðast válistamat við fjóra meginþætti:

- hversu algeng tegundin er
- útbreiðslumynstur, þ.e. hvort tegundin er mjög staðbundin eða dreifð
- stofnbreytingar á tilgreindu tímabili sem tekur mið af kynslóðalengd
- tölfraðilega spá um stofnbreytingar í framtíðinni

Á svæðisbundnum válistum er auk þess tekið tillit til þess hvort um einangraða stofna er að ræða og metnar líkur á landnámi út frá lífsháttum tegundar.

Viðmið IUCN vegna válistaflokkunar (A–E) og lágmarkskröfur fyrir því að tegund flokkist í útrýmingarhættu eru í grófum dráttum tekin saman í 2. töflu.

1. tafla. Hættuflokkun IUCN vegna mats á tegundum á válista. – *IUCN red list categories.*

VÁLISTATEGUNDIR			TEGUNDIR Í HÆTTU
EX	Tegund telst vera útdauð þegar enginn vafi er talin á því að síðasti einstaklingurinn af tegundinni sé dauður. Tegund telst útdauð þegar ekki finnst einn einasti einstaklingur hennar þrátt fyrir ítarlega leit á þekktum eða líklegum búsvæðum á öllu útbreiðslusvæði hennar. Leita verður á þeim tíma sem samræmist lífsferli og lífmynd tegundarinnar.		
EW	Tegund telst vera útdauð í náttúrunni þegar hún lifir hvergi villt svo vitað sé heldur aðeins í ræktun eða í haldi, eða sem ílendur stofn/stofnar fjarri fyrri útbreiðslusvæðum. Tegund telst útdauð í náttúrunni þegar ekki finnst einn einasti einstaklingur hennar þrátt fyrir ítarlega leit á þekktum eða líklegum búsvæðum á öllu útbreiðslusvæði hennar. Leita verður á þeim tíma sem samræmist lífsferli og lífmynd tegundarinnar.		
RE	Tegund telst vera útdauð á svæði þegar enginn vafi leikur á því að síðasti einstaklingurinn sem hugsanlega er fær um að fjölga sér á viðkomandi svæði, hefur dáið eða horfið af landinu (svæðinu).		
CR	Tegund telst vera í bráðri hættu þegar eindregnar líkur eru á að hún verði útdauð í náttúrunni í náinni framtíð samkvæmt tilteknum forsendum.		
EN	Tegund telst vera í hættu , en þó ekki í bráðri hættu, þegar mjög miklar líkur eru á að hún verði útdauð í náttúrunni í fyrirsjáanlegri framtíð, samkvæmt tilteknum forsendum.		
VU	Tegund telst vera í nokkurri hættu , en þó hvorki í bráðri hættu né í hættu samanber hér að framan, ef miklar líkur eru á að hún verði útdauð í náttúrunni í framtíðinni samkvæmt tilteknum forsendum.		
NT	Tegundir sem eru nálægt því að flokkast í nokkurri hættu samkvæmt tilteknum forsendum.		
DD	Tegund fellur í þennan flokk þegar upplýsingar um útbreiðslu hennar og stofnstærð eru ekki nægilegar til þess að hægt sé að meta hvort hún sé í útrýmingarhættu.		
LC	Tegundir sem falla í hvorugan undirflokkinn hér að framan. Útbreiddar og algengar tegundir falla í þennan flokk. Ekki er talin hætta á að tegundin verði útdauð, að gefnum forsendum.		
NA	Tegund getur fallið undir skilgreiningar þessa flokks vegna eftirfarandi: (a) ekki er um villta tegund að ræða, tegundin er innflutt og telst ekki til íslenskrar flóru og fínu. (b) ef um flökkutegund er að ræða, hvort sem um reglubundnar heimsóknir er að ræða eða fáein tilfelli. (c) tegund er á jaðri útbreiðslusvæðis á því svæði sem lagt er mat á og/eða yfirleitt er aðeins um örfáa einstaklinga að ræða.		
NE	Tegund telst ekki hafa verið metin ef ekki hefur ennþá verið beitt við matið þeim skilgreiningum og aðferðum sem hér hefur verið lýst.		

2. tafla. Samantekt fimm viðmiða (A–E) sem notuð eru til að meta hvort tegund sé í hættuflokki á válista (CR, EN, VU). – Summary of the five criteria (A–E) used to evaluate if a taxon belongs in an IUCN Red List threatened category, (CR, EN, VU).

A. Fækkun í stofni á síðustu 10 árum eða yfir þrjár kynslóðir (hvor tíminn sem er lengri), byggt á einhverju af A1–A4				
	CR	EN	VU	
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	
A2, A3 og A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%	
A1	Fækkun í stofni hefur átt sér stað – orsakir fækkunar eru afturkræfar, vel skilgreindar og hafa stöðvast			
A2	Fækkun í stofni hefur átt sér stað – orsakir fækkunar geta enn staðið yfir, eru óljósar eða óafturkræfar			
A3	Spár og ályktanir benda til að fækkun verði í stofni í framtíðinni (allt að 100 ár fram í tímann)			
A4	Fækkun í stofni sem nær bæði yfir fortíð og framtíð (allt að 100 ár fram í tímann) þar sem orsakir geta ekki verið hættar, skilgreindar eða afturkræfar.			
Byggt á einhverju af eftirfarandi: (a) beinum athugunum (ekki fyrir A3) (b) vísitölu stofnstærðar (c) samdrætti í útbreiðslusvæði (EOO), búsvæðagæðum eða búsvæðisfláka (AOO) (d) raunverulegu eða mögulegu álagi vegna nýtingar (e) áhrifum framandi tegunda, blendinga, sjúkdóma, mengunar, samkeppni eða sníkla				
B. Landfræðileg útbreiðsla, annað hvort útbreiðslusvæði (B1) eða nýtingarsvæðis (B2)				
	CR	EN	VU	
B1	Útbreiðslusvæði			
B2	Nýtingarsvæði			
B1	< 100 km²	< 5.000 km²	< 20.000 km²	
B2	< 10 km²	< 500 km²	< 2.000 km²	
OG að minnsta kosti tvö af eftirfarandi þremur skilyrðum:				
(a)	Mjög sundurslitin útbreiðsla EÐA fjöldi staða	= 1	≤ 5	≤ 10
(b)	Stöðugur samdráttur í (i) útbreiðslusvæði, (ii) nýtingarsvæði, (iii) stærð, útbreiðslu og/eða gæðum búsvæða, (iv) fjölda staða eða undirstofna, (v) fjölda þroskaðra einstaklinga			
(c)	Miklar sveiflur í einhverju af eftirfarandi: i) útbreiðslusvæði, (ii) nýtingarsvæði, (iii) fjölda staða eða undirstofna, (iv) fjölda þroskaðra einstaklinga			
C. Lítil stofnstærð og samdráttur				
	CR	EN	VU	
Fjöldi þroskaðra einstaklinga	< 250	< 2.500	< 10.000	
OG að minnsta kosti annað hvort C1 eða C2				
C1	Stöðugur samdráttur (hámark 100 ár fram í tímann)			
C1	Stöðugur samdráttur OG að minnsta kosti eitt af þremur eftirfarandi skilyrðum:			
(a)	Fjöldi þroskaðra einstaklinga í hverjum undirstofni	≤ 50	≤ 250	≤ 1.000
(a)	Hlutfall þroskaðra einstaklinga í einum undirstofni =	90–100%	95–100%	100%
(b)	Miklar sveiflur í fjölda þroskaðra einstaklinga			
D. Mjög lítill eða takmarkaður stofn				
	CR	EN	VU	
D	Fjöldi þroskaðra einstaklinga			
D2	Á einungis við um hættuflokkinn VU Takmarkað nýtingarsvæði eða fjöldi staða þar sem líkleg framtíðarógn getur leitt til þess að tegund færist í flokk CR eða EX á mjög skömmum tíma			
D	< 50	< 250	D1 < 1.000	
D2	D2 Yfirleitt: Nýtingarsvæði < 20km² eða fjöldi staða ≤ 5			
E. Meginleg greining				
	CR	EN	VU	
Líkur á að tegund deyi út í náttúrunni:	≥ 50% innan 10 ára eða 3 kynslóða, hvort sem er lengra (hámark 100 ár)	≥ 20% innan 20 ára eða 5 kynslóða, hvort sem er lengra (hámark 100 ár)	≥ 10% innan 100 ára	



MAT Á FUGLATEGUNDUM

Til skoðunar voru þær fuglategundir hafa orpið hér samfelld síðastliðin 10 ár (81 tegund), reglulegir gestir sem fyrir lágu viðunandi upplýsingar um (6 tegundir) og fyrrum reglulegir varpfuglar (4 tegundir). Alls var því 91 tegund metin (3. tafla). Flækingsfuglar voru ekki teknir með í matið en samkvæmt reglum IUCN skal þó geta þeirra flækingsfugla sem eru á heimsválista, óháð stöðu þeirra hér á landi.

Á válista lenda 43 tegundir, þar af eru 39 taldar í hættu, þ.e. fjórar í bráðri hættu (CR), 10 í hættu (EN) og 25 í nokkurri hættu (VU).

Skýringar á töflum

Tegundum er raðað eftir stafrófsröð fræðiheita innan hvers flokks og samkvæmt fyrirmælum IUCN byggir flokkunin á tegundalista BirdLife International. Með fræðiheiti fylgir höfundarnafn.

Mat á íslenskum fuglategundum miðast í flestum tilvikum við varpstofn (B; *breeder*) en í nokkrum tilvikum við far- eða vetrarstofn (V; *visitor*).

Viðmið (A–E) við válistamat eru samkvæmt leiðbeiningum IUCN (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017). Nánari forsendur fyrir hverja tegund má finna á staðreyndasíðum á vef Náttúrufræðistofnunar.

Breytingar á flokkun miðað við válista 2018 er auðkennd með eftirfarandi táknum:

— Sami flokkur og í válista 2018

! Ný tegund á válista (var ekki metin árið 2018)

↑ Tegund sem hefur verið metin í hærri flokk frá síðasta mati

↓ Tegund sem hefur verið metin í lægri flokk frá síðasta mati

3. tafla. Fjöldi metinna tegunda, tegunda í hættu og válistategunda ásamt fjölda tegunda í hverjum hættuflokki. – Number of assessed, endangered and red-listed species as well as the number of species in the various red-list categories by species group.

Fjöldi – Number			
43 Tegundir á válista Red listed species	Tegundir metnar – Assessed species		91
	EX	Útdauð í heiminum – Extinct	1
	RE	Útdauð á íslandi – Regionally extinct	3
	CR	Í bráðri hættu – Critically Endangered	4
	EN	Í hættu – Endangered	10
	VU	Í nokkurri hættu – Vulnerable	25
	NT	Í yfirvofandi hættu – Near Threatened	19
	DD	Upplýsingar skortir – Data Deficient	0
	LC	Ekki í hættu – Least Concern	26
			39
			Tegundir í hættu Endangered species

VÁLISTI FUGLA

EX – Tegund útdauð í heiminum – *Extinct*

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Mat	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>B/V</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Pinguinus impennis</i> (Linnaeus, 1758)	Geirfugl	B	EX		—	EX	EX	

RE – Tegundir útdauðar á Íslandi – *Regionally Extinct*

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Mat	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>B/V</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758)	Haftyrðill	B	RE		—	LC	LC	
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Gráspör	B	RE		—	LC	LC	
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Keldusvín	B	RE		—	LC	LC	

CR – Tegundir í bráðri hættu – *Critically endangered*

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Mat	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>B/V</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Catharacta skua</i> (Brünnich, 1764)	Skúmur	B	CR	A4abc	—	LC	LC	
<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Lundi	B	CR	A4abc	—	EN	VU	A4abcde
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Fjöruspói	B	CR	D	—	NT	NT	A2bcd+3bcd+4bcd
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Svartbakur	B	CR	A2abc	↑	LC	LC	

**EN – Tegundir í hættu – Endangered**

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Mat	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>B/V</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Blesgæs	V	EN	A4a	—	LC	LC	
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Duggönd	B	EN	A2ab	—	LC	LC	
<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	Sendlingur	B/V	EN	A2b	—	LC	LC	
<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	Fálki	B	EN	A2ab	↑	LC	LC	
<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	Fýll	B	EN	A4abc	—	VU	LC	
<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Haförn	B	EN	D	—	LC	LC	
<i>Hydrobates leucorhous</i> (Vieillot, 1818)	Sjósvála	B	EN	B2ab(v)	↑	NT	VU	A2bce+3bce+4bce
<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Hvítmáfur	B	EN	A2abc	—	LC	LC	
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Þórshani	B	EN	D	—	LC	LC	
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Kjóí	B	EN	A4abc	—	EN	LC	

VU – Tegundir í nokkurri hættu – Vulnerable

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Mat	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>B/V</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Eyrugla	B	VU	(D)	—	LC	LC	
<i>Bubo scandiacus</i> (Linnaeus, 1758)	Snægla	B	VU	(D)	—	LC	VU	A2bd+3bd+4bd
<i>Bucephala islandica</i> (Gmelin, 1789)	Húsönd	B	VU	D2	—	NT	LC	
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Lóupræll	B	VU	A2ab	↑	LC	NT	
<i>Cephus grylle</i> (Linnaeus, 1758)	Teista	B	VU	A2ab	↓	LC	LC	
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Hrafn	B	VU	C1; (A2abc)	—	LC	LC	
<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Himbrimi	B	VU	D	—	LC	LC	
<i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758)	Tjaldur	B	VU	A4b	—	VU	NT	A2bc+3b+4bc
<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Stormsvala	B	VU	D2	—	LC	LC	
<i>Hydrocoloeus minutus</i> Pallas, 1776	Dvergmáfur	B	VU	(D)	—	LC	LC	
<i>Mareca strepera</i> Linnaeus, 1758	Gargönd	B	VU	(C1)	↑	LC	LC	
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Gulönd	B	VU	D1	—	LC	LC	
<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Súla	B	VU	D2	—	LC	LC	
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Spói	B	VU	A2ab	↑	LC	LC	
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Snjótittlingur	B	VU	A2abc	—	LC	LC	
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Heiðlóa	B	VU	A2ab	↑	LC	LC	
<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	Skrofa	B	VU	D2	—	LC	LC	
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Rita	B	VU	A4ab	—	VU	VU	A2abd+3bd+4abd
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Skógarsnípa	B	VU	(D)	—	LC	LC	
<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Skeiðönd	B	VU	(D)	—	LC	LC	
<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Barrfinka	B	VU	(D)	—	LC	LC	
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Fjallkjói	B	VU	(D)	—	LC	LC	
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Kríá	B	VU	A2abc	—	LC	LC	
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Stelkur	B	VU	A2ab	↑	VU	LC	
<i>Uria lomvia</i> (Linnaeus, 1758)	Stuttnefja	B	VU	A4ab	↓	LC	LC	

**NT – Tegundir í yfirvofandi hættu – Near threatened**

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Mat	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>B/V</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Grafönd	B	NT	(D1)	—	VU	LC	
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Urtönd	B	NT		↑	LC	LC	
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Grágæs	B	NT		↑	LC	LC	
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tildra	V	NT		↑	LC	NT	A2bcd+4bcd
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Brandugla	B	NT	(D1)	↓	LC	LC	
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Skúfönd	B	NT		↑	NT	LC	
<i>Gulosus aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	Toppskarfur	B	NT		↓	LC	LC	
<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758)	Straumönd	B	NT		↑	LC	LC	
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Sílamáfur	B	NT		!	LC	LC	
<i>Lagopus muta</i> (Linnaeus, 1758)	Rjúpa	B	NT		—	LC	LC	
<i>Larus argentatus</i> (Linnaeus, 1758)	Silfurmáfur	B	NT		—	LC	LC	
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Jaðrakan	B	NT		↑	NT	NT	
<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Rauðhöfðaönd	B	NT		↑	LC	LC	
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Toppönd	B	NT		↑	NT	LC	
<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Óðinshani	B	NT		!	LC	LC	
<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Flórgoði	B	NT		↑	NT	VU	A2abce+3bce+4abce
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Æðarfugl	B	NT		↓	EN	NT	A4abcde
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Músarrindill	B	NT		↑	LC	LC	
<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Langvía	B	NT		↓	LC	LC	

LC – Tegundir metnar en ekki í hættu – Least concern

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Auðnutittlingur	LC		—	LC	LC	
<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Álka	LC		↓	LC	LC	
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Stökkönd	LC		—	LC	LC	
<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Heiðagæs	LC		—	LC	LC	
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Þúfutittlingur	LC		—	LC	LC	
<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Margæs	LC		—	LC	LC	
<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Helsingi	LC		—	LC	LC	
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Sanderla	LC		—	LC	LC	
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Rauðbrystingur	LC		—	LC	NT	
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Sandlóa	LC		—	LC	LC	
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Hettumáfur	LC		—	LC	LC	
<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Hávella	LC		↓	LC	VU	A4bce
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Bjargdúfa	LC		—	LC	LC	
<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Álft	LC		—	LC	LC	
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Smyrill	LC		—	VU	LC	
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Hrossagaukur	LC		—	VU	LC	
<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Lómur	LC		—	LC	LC	
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Stormmáfur	LC		—	LC	LC	
<i>Larus glaucoides</i> Meyer, 1822	Bjartmáfur	LC		—	LC	LC	
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Krossnefur	LC	(D1)	—	LC	LC	
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Hrafnstönd	LC		—	LC	LC	
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Maríuerla	LC		—	LC	LC	
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Steindepill	LC		—	LC	LC	
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Dílaskarfur	LC		—	LC	LC	



LC – Tegundir metnar en ekki í hættu – *Least concern*

Fræðiheiti	Íslenskt heiti	Hættu-flokkur	Viðmið	Breyting á flokkun	Evrópu-válisti	Heims-válisti	Viðmið heimsválisti
<i>Latin name</i>	<i>Icelandic name</i>	<i>Category</i>	<i>Criteria</i>	<i>Category changes</i>	<i>European red list</i>	<i>IUCN red list</i>	<i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Glókollur	LC		—	LC	LC	
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Stari	LC		—	LC	LC	
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Brandönd	LC	(D1)	—	LC	LC	
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Skógarpröstur	LC		—	LC	LC	
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Svartpröstur	LC		—	LC	LC	

NA – Tegundir á heimsválista sem eru flækingar á Íslandi – *Not applicable*

Fræðiheiti <i>Latin name</i>	Íslenskt heiti <i>Icelandic name</i>	Hættu- flokkur <i>Category</i>	Evrópu- válisti <i>European Red list</i>	Heims- válisti <i>IUCN red list</i>	Viðmið heimsválisti <i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Ardenna grisea</i> (Gmelin, 1789)	Gráskrofa	NA	NE	NT	A2de+3de+4de
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Skutulönd	NA	VU	VU	A2abcd+3bcd+4abcd
<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Jarpönd	NA	LC	NT	
<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	Fagurgæs	NA	VU	VU	A2bcd+4bcd
<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Efjutíta	NA	VU	VU	A2bc+4bc
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan 1763)	Spóatíta	NA	VU	VU	A2bcd+4bcd
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Vaðlatíta	NA	NE	VU	A2b+4b
<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	Mærutíta	NA	NE	NT	A2b+4b
<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	Fitjatíta	NA	NE	NT	
<i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, 1776)	Roðatíta	NA	NE	NT	
<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Grastíta	NA	NE	VU	A2bc+4bc
<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758	Skræklóa	NA	NE	NT	A2bc+4bc
<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1770)	Fölheiðir	NA	NT	LC	
<i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773	Víðitittlingur	NA	CR	CR	A2acd+3cd+4acd
<i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776	Hrítittlingur	NA	LC	NT	
<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Kvöldfálki	NA	VU	VU	A2abc+3bc+4abc
<i>Gavia adamsii</i> (Gray, 1859)	Svalbrúsi	NA	VU	NT	
<i>Glareola nordmanni</i> Fischer, 1842	Stepputrítill	NA	LC	NT	
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Trjásvarri	NA	NT	NT	A2bcde+3bcde+4bcde
<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	Kanaduðra	NA	NE	VU	A2bd+3bd+4bd
<i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, 1823)	Snípuduðra	NA	NE	NT	A2b+4b
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Lappajaðrakan	NA	LC	NT	
<i>Melanitta americana</i> (Swainson, 1832)	Krummönd	NA	NE	NT	
<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Korpönd	NA	VU	VU	A2abcde



NA – Tegundir á heimsválista sem eru flækingar á Íslandi – *Not applicable*

Fræðiheiti <i>Latin name</i>	Íslenskt heiti <i>Icelandic name</i>	Hættu- flokkur <i>Category</i>	Evrópu- válisti <i>European Red list</i>	Heims- válisti <i>IUCN red list</i>	Viðmið heimsválisti <i>Criteria IUCN red list</i>
<i>Pagophila eburnea</i> (Phipps, 1774)	Ísmáfur	NA	VU	NT	A2bcd+3bcd+4bcd
<i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782	Roðaðflæmingi	NA	NA	NT	
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Grálóa	NA	LC	VU	A2bcd+4bcd
<i>Polysticta stelleri</i> (Pallas, 1769)	Blikönd	NA	LC	VU	A2bcd+3bcd+4bcd
<i>Setophaga cerulea</i> (Wilson, 1810)	Blámaskríkja	NA	NE	NT	A3bc
<i>Setophaga striata</i> (Forster, 1772)	Rákaskríkja	NA	NE	NT	
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Turtildúfa	NA	VU	VU	A2bcd+3bcd+4bcd
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	Hrísastelkur	NA	NE	VU	A2bcd+3bcd+4bcd
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	Mosastelkur	NA	NE	NT	A2bd
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vepja	NA	VU	NT	A2ac+3c+4ac

HEIMILDIR

IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017. *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria*. Version 13. <http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf> [sótt 21.8.2019] (Ath. á þessum tengli er nú að finna 14. útgáfu leiðbeininganna frá árinu 2019)

Náttúrufræðistofnun Íslands. (2000). *Válisti 2: Fuglar*. Náttúrufræðistofnun Íslands. https://utgafa.ni.is/valistar/valisti_2.pdf



FJÖLRLIT NÁTTÚRUFRAEÐISTOFNUNAR

1. Bergþór Jóhannsson 1985. Tillögur um nöfn á íslenskar mosaeðttkvíslir. 35 s.
2. Jóhann G. Guðnason 1985. Dagbók um Heklugosið 1947–1948. 31 s.
3. Oddur Erlendsson 1986. Dagskrá um Heklugosið 1845–6 og afleiðingar þess. 49 s.
4. Haukur Jóhannesson 1987. Heimildir um Grímsvatnagösin 1902–1910. 40 s.
5. Erling Ólafsson 1988. Könnun á smádyrum í Hvannalindum, Fagradal og Grágæsadal. 86 s.
6. Ævar Petersen 1988. Leiðbeiningar við fuglamerkingar. 16 s.
7. Haukur Jóhannesson og Sigmundur Einarsson 1988. Aldur Illahrauns við Svartsengi. 11 s.
8. Sigmundur Einarsson og Haukur Jóhannesson 1989. Aldur Arnarseturshrauns á Reykjanesskaga. 15 s.
9. Haukur Jóhannesson 1989. Aldur Hallmundarhrauns í Borgarfirði. 12 s.
10. Bergþór Jóhannsson 1989. Íslenskir undafíflar. 262 s.
11. Ævar Petersen og Gaukur Hjartarson 1989. Vetrarfuglatalningar: Skipulag og árangur 1987. 42 s.
12. Bergþór Jóhannsson 1989. Íslenskir mosar. Barnamosaett. 94 s.
13. Bergþór Jóhannsson 1990. Íslenskir mosar. Sótmosaett og haddmosaett. 71 s.
14. Erling Ólafsson 1990. Ritverk um íslensk skordýr og aðra hópa landliðdýra. 34 s.
15. Bergþór Jóhannsson 1990. Íslenskir mosar. Slæðmosaett, bólmosaett, taðmosaett og hettamosaett. 80 s.
16. Bergþór Jóhannsson 1990. Íslenskir mosar. Krónamosaett, næfurmosaett, tæfilmosaett, brámosaett, skottmosaett og hnotmosaett. 44 s.
17. Erling Ólafsson 1991. Íslenskt skordýratal. 69 s.
18. Ævar Petersen og Gaukur Hjartarson 1991. Vetrarfuglatalningar: Árangur 1988. 38 s.
19. Bergþór Jóhannsson 1991. Íslenskir mosar. Brúskmosaett. 119 s.
20. Bergþór Jóhannsson 1992. Íslenskir mosar. Vendilmosaett, sverðmosaett, fjöðurmosaett og bikarmosaett. 78 s.
21. Bergþór Jóhannsson 1992. Íslenskir mosar. Grýtmosaett. 122 s.
22. Bergþór Jóhannsson 1992. Íslenskir mosar. Klukkamosaett, dægurmosaett og fleira. 47 s.
23. Ævar Petersen og Gaukur Hjartarson 1993. Vetrarfuglatalningar: Árangur 1989. 43 s.
24. Bergþór Jóhannsson 1993. Íslenskir mosar. Skeggmosaett. 116 s.
25. Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Gunnlaugur Pétursson og Jóhann Óli Hilmarsson 1994. Útbreiðsla varpfugla á Suðvesturlandi. Könnun 1987–1992. 126 s.
26. Bergþór Jóhannsson 1995. Íslenskir mosar. Skænumosaett, kollmosaett, snoppumosaett, perlumosaett, hnappmosaett og toppmosaett. 129 s.
27. Bergþór Jóhannsson 1995. Íslenskir mosar. Hnökkmosaett. 162 s.
28. Jón Hallur Jóhannsson og Björk Guðjónsdóttir 1995. Varpfuglar í Steingrímsfirði og nágrenni. Könnun 1987–1994. 76 s.
29. Bergþór Jóhannsson 1996. Íslenskir mosar. Röðulmosaett, tildurmosaett, glitmosaett, faxmosaett, breytingar og tegundaskrá. 127 s.
30. Bergþór Jóhannsson 1996. Íslenskir mosar. Fossmosaett, ármosaett, flosmosaett, leskjumosaett, voðmosaett og rjúpumosaett. 55 s.
31. Ingi Agnarsson 1996. Íslenskar köngulær. 175 s.
32. Erling Ólafsson og Hálfán Björnsson 1997. Fiðrildi á Íslandi 1995. 136 s.
33. Bergþór Jóhannsson 1997. Íslenskir mosar. Lokkmosaett. 83 s.
34. Bergþór Jóhannsson 1998. Íslenskir mosar. Rytjumosaett. 126 s.
35. Ingi Agnarsson 1998. Íslenskar langfætlur og drekar. 34 s.
36. Bergþór Jóhannsson 1998. Íslenskir mosar. Breytingar og skrár. 101 s.
37. Gunnlaugur Pétursson og Gunnlaugur Þráinsson 1999. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi fyrir 1981. 246 s.
38. Bergþór Jóhannsson 1999. Íslenskir mosar. Hornmosar og 14 ættir soppmosa. 108 s.
39. Ólafur K. Nielsen 1999. Vöktun rjúpnastofnsins. 55 s.
40. Erling Ólafsson 2000. Landliðdýr í Þjórsárverum. Rannsóknir 1972–1973. 159 s.

41. Bergþór Jóhannsson 2000. Íslenskir mosar. Lápmosaætt, kólmosaætt og væskilmosaætt. 151 s.
42. Bergþór Jóhannsson 2001. Íslenskir mosar. Bleðlumosaætt og leppmosaætt. 100 s.
43. Bergþór Jóhannsson 2002. Íslenskir mosar. Refilmosabálgur og stjörnumosabálgur. 70 s.
44. Bergþór Jóhannsson 2003. Íslenskir mosar. Skrár og viðbætur. 135 s.
45. Helgi Hallgrímsson og Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir 2004. Íslenskt sveppatal I. Smásveppir. 189 s.
46. Bergþór Jóhannsson 2004. Undafíflar á ný. 88 s.
47. Ólafur K. Nielsen, Jenný Brynjarsdóttir og Kjartan Magnússon 2004. Vöktun rjúpnastofnsins 1999–2003. 110 s.
48. Helgi Hallgrímsson 2007. Þörungatal. Skrá yfir vatna- og landþörungum á Íslandi samkvæmt heimildum. 94 s.
49. Sigurður H. Magnússon og Kristín Svavarsdóttir. Áhrif beitarfriðunar á framvindu gróðurs og jarðvegs á lítt grónu landi. 67 s.
50. Hörður Kristinsson, Eva G. Þorvaldsdóttir og Björgvin Steindórsson 2007. Vöktun válistaplantna 2002–2006. 86 s.
51. Hörður Kristinsson 2007. Íslenskt plöntutal, blómplöntur og byrkningar. 58 s.
52. Sveinn P. Jakobsson, Erik S. Leonardsen, Tonci Balic-Zunic and Sigurður S. Jónsson 2008. Encrustations from three recent volcanic eruptions in Iceland: The 1963–1967 Surtsey, the 1973 Eldfell and the 1991 Hekla eruptions. 65 s.
53. Sveinn P. Jakobsson 2010. Gömlu íslensku steinasöfnin í Geologisk Museum í Kaupmannahöfn. 69 s.
54. Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir, ritstj. 2016. Vistgerðir á Íslandi. 299 s.
55. Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. 295 s.
56. Gunnhildur Ingibjörg Georgsdóttir, Erlingur Hauksson, Guðmundur Guðmundsson og Ester Rut Unnsteinsdóttir 2018. Selalátur við strendur Íslands. 23 s.
57. Paweł Wąsowicz 2020. Annotated Checklist of Vascular Plants of Iceland. 193 s.
58. Ólafur S. Ástþórsson og Torleiv Brattegard 2022. Útbreiðsla og líffræði agna (krabbadýr: Lophogastrida og Mysida) í hafinu við Ísland. 114 s.
59. Chloé Dépré og Ólafur K. Nielsen 2023. Autumn food of rock ptarmigan *Lagopus muta*: the effect of age, sex, year and location. 23 s.
60. Hörður Kristinsson og Starri Heiðmarsson 2025. Checklist of Icelandic Lichens. 76 s.
61. Náttúrufræðistofnun 2025. Válisti fugla 2025. 21 s.